

阿托品眼藥使用之衛生教育指導

- ✚ 阿托品是透過麻痺睫狀肌來達到控制近視的效果，而瞳孔也會因為虹膜括約肌麻痺而呈現放大狀態。
- ✚ 病人可能會有畏光，看近距離物體時感到模糊(如閱讀、操作電腦時)的症狀，此為點藥之後的正常反應，一般狀況下，年紀小於十四歲的學童大多可逐漸適應。
- ✚ 若於大太陽下從事戶外活動，建議配戴能隔絕紫外線的鏡片，以保護眼睛內部構造。
- ✚ 阿托品為長效藥物，視濃度之不同，停藥後藥效仍可持續二至五天。

羅東聖母醫院 敬祝健康

阿托品眼藥使用之衛生教育指導

病歷號碼：_____ 姓名：_____

於下述就醫日期至羅東聖母醫院就診，屆時領取衛生教育指導單張，經醫師或護理人員說明解釋業已瞭解。

衛教日期	家屬或病患簽名	指導者簽名	指導方式	指導評值
填 表 說 明	指導方式代號說明(可複選)	講述→T1；衛教資料→T2；衛教光碟；示教→T4。		
	指導評值代號說明	完全錯誤或不會→R1；正確說出部份內容→R2；能完全正確說出內容→R3；能正確執行部份技術→R4；能完全正確執行部份技術→R5。		