

## 雷射虹膜切開衛生教育指導

- ✚ 不需要住院,大部份患者均可立即恢復日常活動,但少數有出血傾向,或已大出血的患者則應小心,不宜用力。
- ✚ 治療前必須先將瞳孔儘量縮小,經麻藥點眼後,醫師會放置撐眼及固定用的小鏡子於患者眼內,此時患者必需配合指示燈的指示以調整眼球的位置,並且保持雙眼張開,治療中病人會有痠漲灼熱的痛覺。治療過程視病情的需要每次約 5 到 10 分鐘。爾後再視需要追加治療。
- ✚ 這種治療並沒有任何傷口,但因為雷射具有能量,因此照射後眼睛會畏光及灼熱感,只需稍事休息,眼藥點眼即可。有些病患較為敏感者,則必須服用止痛藥。
- ✚ 有一些病人在手術過程中會出血,造成眼前房出血,以及會有發炎反應,視力可能輕微模糊,只需稍事休息,眼藥點眼一兩天即可復原。

羅東聖母醫院 敬祝健康

## 雷射虹膜切開衛生教育指導

病歷號碼：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

於下述就醫日期至羅東聖母醫院就診,屆時領取衛生教育指導單張,經醫師或護理人員說明解釋業已瞭解。

衛教日期	家屬或病患簽名	指導者簽名	指導方式	指導評值
填表	指導方式代號說明(可複選) 講述→T1; 衛教資料→T2; 衛教光碟; 示教→T4。			
說明	指導評值代號說明 完全錯誤或不會→R1; 正確說出部份內容→R2; 能完全正確說出內容→R3; 能正確執行部份技術→R4; 能完全正確執行部份技術→R5。			