

## 藥物過敏衛生教育指導

藥物過敏是指口服、塗抹或注射藥物後，身體出現免疫性的抗拒反應，可能與個人體質、合併的疾病、藥物的種類特性有關，任何藥物皆有可能引起過敏。

藥物疹的表現非常多樣化，不一定會出現在首次用藥後，也可能多次服藥後才出現徵狀，過敏症狀可以立即發生，也可以延遲數天、數週才出現。

1. 認識自己用的藥物，按照醫囑的劑量和時間服藥，不任意停藥、換藥、加藥或使用來路不明的藥物。
2. 提高用藥警覺性，若服藥後有皮膚紅疹、口腔喉嚨不適、眼睛不適、發燒、頭暈昏眩、呼吸困難等疑似過敏症狀，應立即回診請醫師評估是否為藥物引起的過敏反應。
3. 如果已知對某些藥物會過敏，可以將藥品名稱註記於健保 IC 卡，或是利用藥物過敏紀錄卡，連同健保卡隨身攜帶，就醫時主動告知醫療人員過敏史。
4. 認識自己用的藥物，按照醫囑的劑量和時間服藥，不任意停藥、換藥、加藥或使用來路不明的藥物。

羅東聖母醫院 敬祝健康

## 藥物過敏衛生教育指導

姓名：		病歷號碼：		生日：____年____月____日	
指導對象	指導日期	指導方式	指導評值	指導者簽名	接受指導者簽名
<input type="checkbox"/> 病患 <input type="checkbox"/> 家屬					
指導方式說明(可複選)：講述→T1；衛教資料→T2；示教→T3。 指導評值說明(可複選)：完全錯誤或不會→R1；正確說出部分內容→R2；能完全說出內容→R3；能正確執行部分技術→R4；能完全正確執行→R5。					