

靜脈注射衛生教育指導

1. 點滴瓶不可低於注射部位，避免血液逆流造成阻塞。
2. 不可自行調整點滴滴速，以避免以免太快造成心臟負荷；或太慢造成阻塞或凝固。
3. 避免過度彎曲注射之部位，以避免注射針移位。
4. 注射部位避免弄濕，保持清潔及乾燥減少發生感染機會。
5. 點滴注射時若需更換衣服時，請通知護理人員給予協助。
6. 當患者有下列情形時，請告知護理人員：
 - (1) 注射部位有紅腫熱痛及異常分泌物時。
 - (2) 點滴接頭鬆脫、滲血或漏水。點滴速度變慢或不滴。
 - (3) 當點滴瓶中的液體快滴空時或點滴滴空了。(瓶中的空氣因為壓力的關係，會停留在管中，並不會進入人體內。)
 - (4) 打點滴時，出現呼吸困難、心跳加速等不舒服的情形時。

羅東聖母醫院 敬祝健康

靜脈注射衛生教育指導

姓名：		病歷號碼：		生日：____年____月____日	
指導對象	指導日期	指導方式	指導評值	指導者簽名	接受指導者簽名
<input type="checkbox"/> 病患 <input type="checkbox"/> 家屬					
指導方式說明(可複選)：講述→T1；衛教資料→T2；示教→T3。 指導評值說明(可複選)：完全錯誤或不會→R1；正確說出部分內容→R2；能完全說出內容→R3；能正確執行部分技術→R4；能完全正確執行→R5。					