


注射化療衛生教育指導

✚ 角針方面


1. 改變姿勢時，不要以注射化療藥物的手臂來支撐身體或過度用力(如下圖)。



2. 請勿睡向角針留置的那一側，以免影響角針輸注過程及移位。(如左下圖)
3. 人工血管留置處的透明膠膜或紙膠有潮濕或脫落時，請通知護理師更換，以維持管路固定之安全。(如右下圖)




4. 若人工血管留置處的角針出現發紅、腫脹、疼痛、針刺感、灼熱感、潮濕或點滴滴注不順時，請立即告知護理師處理。



點滴幫浦(IV PUMP)注射機器注意方面

1. 留置角針後，在如廁下床活動時，推點滴幫浦前需將插頭拔出，機器發出警示聲音屬正常，當插頭抽回去之後，仍有警示聲音表示異常，務必通知護理人員。

下床活動前插頭要拔



幫浦機器有蓄電功能



但仍需要插著、
避免完全沒電




下床活動




上床後插頭要插回

2. 不可自行調整滴速或幫浦設定，當發生問題或幫浦警示聲響時，請通知護理人員處理。



3. 藥物輸注期間，建議有家屬在旁陪伴，協助住院期間的日常生活所需。
4. 正確的推機器，可避免推拉過程導致機器傾倒、拉扯管路，若機器點滴推車難推、覺得輪子卡卡的，可至護理站反應。



二合一的機器推車有把手可以握，可握著把手推

機器推車有把手可以握，可握著把手推

機器推車沒有把手的，可握著機器上方的點滴架推

三、日常生活方面

1. 注射期間建議飲食上可採清淡、避免油膩，盡量攝取水分，避免脫水、少量多餐方式進食。
2. 白血球的數目在化學治療後可能降低，此時較容易受到感染，為化學治療最危險的副作用。



4. 建議要吃有可剝皮食物及水果，例如：橘子、香蕉、西瓜、蘋果要削皮後吃。



5. 勿出入公共場所，若必要時需出入公共場所，建議戴口罩。
6. 多洗手。
7. 如果有腹瀉情形，建議用溫水清洗臀部，減少破皮機率。

