

動靜脈瘻管照顧衛生教育指導

- ✦ 每天用手觸摸瘻管，注意是否有“咻咻”血流聲，若搏動現象減弱或消失，須立即就醫。
- ✦ 避免動靜脈瘻管手臂受壓迫、提重物、抽血、量血壓、帶手錶、手鐲、當枕頭等，以防血液循環不良，造成栓塞。
- ✦ 透析後，當日傷口應保持乾燥，紗布包紮 24 小時，避免感染發生。
- ✦ 血管過度膨脹時，可用彈性護套，保護防止血流過強，造成心臟衰竭。
- ✦ 若有紅、腫、熱、痛等現象，應立即就醫治療。
- ✦ 透析前一天可適當的熱敷瘻管手臂（避免燙傷），促進血液循環。
- ✦ 若不小心割傷手部，大量出血時，應直接壓迫傷口，立即就醫。
- ✦ 手術三天後，常做手部運動，如：握球運動，增加瘻管功能。
- ✦ 透析後若有紅腫現象，第一天用冰敷止血止痛，第二天再用熱敷消腫。
- ✦ 養成天天沐浴的習慣，保持清潔，沐浴時用溫水熱敷，並加以按摩。
- ✦ 冷天穿衣時，避免袖口太緊，以防壓迫瘻管，特別是捲袖子時。